

## FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

(decreto ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite")

# TRATTAMENTO PER LE SOLE AZIENDE BIOLOGICHE o che utilizzano Buprofezin (es. Applaud)

## NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA DELLA VITE

Occorre attendere la fine del periodo di fioritura della vite e l'avvenuta allegazione

**Aziende biologiche**: il primo trattamento deve essere effettuato tra l'11 e il 14 giugno con piretro subito dopo la fine della fioritura e ripetuto ogni 7-10 giorni.

**Aziende convenzionali** che intendono utilizzare il Buprofezin il trattamento deve essere effettuato subito dopo la fine della fioritura tra l'11 e il 14 giugno

**Le aziende convenzionali** che non utilizzano il Buprofezin non devono ancora trattare e seguirà apposito comunicato.

### Salvaguardia degli insetti pronubi

(Legge regionale 3/8/98, n. 20)

**Divieto trattamenti insetticidi in fioritura. - Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi - Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).**

### ACCORGIMENTI

**Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7 - Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione - Trattare tutti i filari da entrambi i lati - Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni - Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.**